

# RestoreX®


جهاز العلاج بالسحب القضيبى من الجيل التالي  
لعلاج انحناء القضيب وتشوهه وطوله والحفاظ على وظيفة الانتصاب  
بعد استئصال البروستاتا

تم تطويره بالتعاون مع Mayo Clinic




## تعليمات الاستخدام

# دليل الإعداد السريع





## الخطوة 1 - ضبط اتجاه الانحناء (إن أمكن)


ما الوضع الأكثر تشابهًا مع حالتك؟





إذا لم تكون هناك تغييرات  
مطلوب، فانتقل إلى الخطوة 2.





كيفية ضبط الأذرع (إن أمكن):



I



II




III

حرك جهاز السحب  
على الأذرع

استبدل البراغي  
لتشبيت الأذرع

IV

كيفية ضبط المشبك (إن أمكن):



## الخطوة 2 - ضبط موضع المشبك (إن أمكن)

ما هدفك من العلاج؟


الإطالة فقط و/أو الحفاظ على وظيفة الانتصاف

تحسين الانحناء أو الانبعاج أو شكل الساعة الرملية  
أو أي تشوه مماثل بالإضافة إلى الطول


إذا لم تكن هناك تغييرات مطلوبة، فانتقل إلى الخطوة 3




أكثر من 7.5 سم  
(3 بوصات)\*



5-7.5 سم  
إلى 3 بوصات)\*



أقل من 5 سم  
(2 بوصة)





إذا لم تكن هناك تغييرات مطلوبة،  
فانتقل إلى الخطوة 3.


\* ملاحظة: اعتماداً على طول القصبيب، قد يكون الوضع 2 أو 3 غير ممكن.

## الخطوة 3 - تعديلات إضافية (حسب الحاجة)



التغيير إلى أذرع أطول:



I



II



III

حرك جهاز السحب  
على الأذرع





استبدل البراغي  
لتشييل الأذرع



IV

## الخطوة 3 - تعديلات إضافية (حسب الحاجة)



ضبط ارتفاع المشبك:




I



II



III



IV


## المبادئ الأساسية لتحسين النتائج

- يستخدم فقط مع القصيب الرخو (غير المنتصب).
- استخدم الجهاز لمدة 30-60 دقيقة يومياً - لا تفوت أياماً إن أمكن. افصل بين جلسات العلاج التي مدتها 30 دقيقة بفواصل مدتها 30 دقيقة على الأقل.
- يجب ألا تكون الأشرطة البيضاء مرئية في أثناء الاستخدام.
- يجب أن يكون جلد القصيب مرتخياً في أثناء الاستخدام، وقد تحتاج إلى سحب جلد الصفن أو جلد القصيب الزائد في أثناء الاستخدام.

للانحناءات القريبة من قاعدة الجسم



ضع لفافة شاش على قاعدة القضيب بين القضيب والجهاز - استخدم فقط نقطة التوقف الأولى أو الثانية (30 درجة أو 60 درجة) في حالة الانحناء العكسي:




امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً  
لمشاهدة عرض بالفيديو لاستخدام الجهاز:




# استخدام الجهاز

## استخدام الجهاز

### الخطوة 2 - تثبيت القصيبي في الجهاز



ضع القصيبي الرخو (غير المنتصب) عبر الحلقة الأساسية وفي المشبك.  
\* ملاحظة - يجب وضع حافة رأس القصيبي داخل الحافة المرتفعة للمشبك.




يجب تثبيت المشبك بإحكام قدر الإمكان  
(دون التسبب في حدوث ألم) لمنع الانزلاق.




تعديل الارتفاع اختيارياً.  
راجع الصفحة 8.

## استخدام الجهاز

### الخطوة 1 - التحضير




ب1



ج1

اقفل التوابض عن طريق دفع (ضغط)  
الجهاز معًا.




حرك الجهاز مرة أخرى إلى  
موقع البدء.




ج

قم بلف رأس القصيبي بلفافة أو  
شاش لاصق ذاتياً.

\* ملاحظة - اسحب القلفة قبل  
وضعها إذا كانت موجودة.



الخيار لممنع الانزلاق.




خيار لمزيد من الراحة.


## استخدام الجهاز

### الخطوة 3 - إضافة السحب المستقيم

ذراع المؤشر مضغوطة بالكامل تقريباً.



تحقق من كمية السحب.





التحسين



III

ذراع المؤشر غير مضغوطة بصورة كافية.


يتم توفير السحب الأمثل.  
افحص أذرع المؤشر بصورة دورية لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى سحب إضافي.



اقفل النوايب عن طريق دفع الجهاز نحو جسمك.



حرّك الجهاز بنقرة واحدة أو أكثر حتى يخضع القصيبي للحد الأقصى من التمدد.





حرر النوايب عن طريق دفع الجهاز نحو جسمك.

## استخدام الجهاز





### الخطوة 3 - إضافة السحب المستقيم

التمديد

I



قم بتمديد الجهاز إلى أقصى حد ممكن.






حرر النوايب عن طريق دفع الجهاز نحو جسمك.

اسحب جلد القصيبي والصفن الزائد حسب الحاجة للتأكد من أن جلد القصيبي مرتفع في أثناء تلقي السحب.

## استخدام الجهاز

### الخطوة 4 - الانحناء العكسي (إن أمكن)

يتم استخدام الانحناء العكسي فقط في حالات انحناء القصبي أو تشوّهات الانبعاج/شكل الساعة الرملية.



احن الجهاز بصورة مضادة عن طريق الضغط على الزرين الأزرقين على الجانبين في وقت واحد كما هو موضح على اليمين. بالنسبة إلى الانحناءات الموجودة في منتصف القضيب أو طرفه، انتقل إلى الموضع الثالث أو الرابع (ملاحظة: الموضع الثالث موضح في الصور).

بالنسبة إلى الانحناءات القريبة من قاعدة الجسم، انتقل إلى الموضع الثاني وضع لفافة شاش عند قاعدة القضيب على النحو الموضح في على النحو الموضح في الصفحة 11. ملاحظة: من أجل الراحة، قد ترغب في لف عمود القضيب بشاش أو ورق تواليت حتى يمكنه الانزلاق بسهولة أكبر في أثناء عملية الانحناء العكسي.

II

قم بتمديد الجهاز باتباع الخطوات الموضحة في الخطوة 3 مع الانحناء العكسي للجهاز.

III

## استخدام الجهاز


### الخطوة 4 - الانحناء العكسي (إن أمكن)

يتم استخدام الانحناء العكسي فقط في حالات انحناء القصبي أو تشوّهات الانبعاج/شكل الساعة الرملية.

قم بطيّ الجهاز بالكامل مع إبقاء القضيب داخل المشبك. يُتم ذلك عن طريق ضغط النوابض وإعادة الجهاز إلى القاعدة (الصفحة 12 و1أ و1ب)\*

\***ملاحظة - انتبه للغاية لتجنب قرص جلد الصفن في أثناء عودة الجهاز إلى الجسم.**




I





## استخدام الجهاز

### الخطوة 4 - أمثلة على الانحناء العكسي



ما الصورة الأقرب إلى حالتك؟



انحناء سفلي






انحناء علوي وجانبي





## استخدام الجهاز

### الخطوة 4 - أمثلة على الانحناء العكسي




ما الصورة الأقرب إلى حالتك؟



انحناء علوي




انحناء أيمين




انحناء أيسر

## استخدام الجهاز



### الخطوة 5 – إزالة الجهاز (بعد اكتمال العلاج)



قم بإزالة أي لفافات على القصيبي.



اضغط على زر التحرير لتحرير  
القصيبي من الجهاز.









قم بتخزين الجهاز مع التوابض في  
حالة غير مضغوطة.

### ملاحظات بشأن الأعراض المتوقعة:

- من الطبيعي أن يكون رأس القصبي أزرق اللون/بارداً في أثناء وجوده في المشبك.
- يُعد الشعور بالانزعاج أمراً طبيعياً في أثناء استخدام السحب، خاصة خلال أول 1-2 أسبوع من الاستخدام.
- من الطبيعي أيضاً انخفاض الإحساس بصورة طفيفة خلال مدة العلاج.
- من الشائع حدوث حساسية الجلد الخفيفة من استخدام اللفافات على القصبي.
- توقف عن الاستخدام واتصل بقائد الرعاية الطبية الخاص بك إذا كانت لديك أي أعراض متوسطة أو شديدة أو أعراض مستمرة بعد التوقف عن السحب.

## استخدام الجهاز

### الخطوة 4 – أمثلة على الانحناء العكسي



تعُج / تضييق

## استخدام الجهاز

### مرات العلاج الموصى بها

دواعي الاستعمال	السحب المستقيم	الانحناء العكسي	مدة استمرار العلاج
تصحيح الانحناء + الطول	30 دقيقة، 1-2 مرة/اليوم	لا شيء <sup>1</sup>	9-3 أشهر <sup>1</sup>
تصحيح شكل الساعة الرملية	15 دقيقة، 1-2 مرة/اليوم	15 دقيقة، 1-2 مرة/اليوم	9-3 أشهر <sup>2,1</sup>
مرحلة ما بعد استئصال البروستاتا	30 دقيقة، 1-2 مرة/اليوم	لا شيء	10 دقائق، 1-2 مرة/اليوم في كل اتجاه باستثناء اتجاه الانحناء [إن وجد]
الطبطة فقط	تصحيح الانحناء +	لا شيء	5 أشهر

<sup>1</sup> أشهـر كحد أدنـى، قد يستمر لمـدة تصل إـلى 9 أشهـر إذا رغـبت في ذلك للحصول على تحـسـينـات إـضافـية.

<sup>2</sup> في الأسبـوع الأول من العـلاج، قـم بإـجرـاء السـحب المـستـقـيم فـقط. يمكن استـخدـام الانـحنـاء العـكـسـي بدـءـاً من الأـسـبـوع الثـانـي.

في حال وقوع أي حادث خطير، اتصل بـ **PathRight Medical** والسلطة المختصة في موقعك.

هدف RestoreX إلى تصحيح تشوهات القضيب المتمثلة في الانحناء والطول المفقود.

## فئة المرض

RestoreX مخصص للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عاماً والذين يعانون من انحناء القضيب و/أو فقدان الطول بسبب مرض بيروني أو أولئك الذين يخضعون لعملية استئصال البروستاتا.

## دوعي الاستعمال:

- لتصحيح انحناء القضيب أو تشوشه بالانبعاج/شكل الساعة الرملية.
- لزيادة طول القضيب.
- وللحـد من فقدـان وظـيفـة الـانتـصـاب بـعد استـئـصال البرـوـسـتـاتـا.

## تحذيرات:

- لا تستخدم الجهاز لفترة أطول من الموصى بها، ولا تُنْصِف قوـة سـحب إـضافـية لـجـهاـز من خـلـال استـخدـام موـاد خـارـجـية مـثـل الأـوزـانـ، أو تـشـدـيد قـلـلـ المشـبـكـ لأنـ ذـلـك قدـ يـؤـديـ إـلـى أـلـمـ أو تـلـفـ فيـ تـشـيـرـ/فـسيـلـوجـياـ القـضـيـبـ أوـ الخـصـيـةـ أوـ كـيسـ الصـفـنـ.
- لا تـسـتـخـدـم جـهاـزاً مـلـطـحاـ أوـ مـتـسـحـاـ أوـ تـشـارـكـ الأـجـهـزـةـ بـيـنـ الأـفـرـادـ لأنـ ذـلـك قدـ يـؤـديـ إـلـى اـنتـقالـ العـدـوـيـ.
- توـحـ الحـذـرـ عـنـ ثـبـيـتـ رـأـسـ القـضـيـبـ بـالـمـشـبـكـ، وـقـلـلـ أـلـزـعـ الشـدـ، وـتـحـرـيـكـ أـلـدـةـ التـمـدـيـدـ لأنـ ذـلـك قدـ يـؤـديـ إـلـى قـرـصـ الجـلـدـ.
- قدـ يـؤـديـ ذـلـكـ إـلـى حدـوثـ كـدـمـاتـ أوـ نـزـفـ أوـ تـهـيـجـ أوـ تـمـرـفـاتـ فـيـ الـجـلـدـ أوـ تـورـمـ أوـ انـخـفـاضـ مـسـتـوىـ الـإـحـسـاسـ.
- لا تـضـعـ عـمـودـ القـضـيـبـ فـيـ الـمـشـبـكـ لأنـ ذـلـكـ قدـ يـؤـديـ إـلـى تـدـبـ القـضـيـبـ.

## الاحتياطات:

- تأكدـ منـ تـبـيـتـ جـمـيعـ الـبـرـاغـيـ يـاـ حـكـامـ قـبـلـ استـخدـامـ الـجـهاـزـ.
- لا تـسـتـخـدـمـ الـجـهاـزـ فـيـ حالـ تـلـفـهـ وـلـاـ تـضـعـهـ فـيـ غـسـالـةـ الـأـطـبـاقـ أوـ فـنـ الـمـيـكـرـوـوـفـ.
- يـجبـ توـحـيـ الحـذـرـ أـلـثـنـاءـ وـضـعـ الـلـفـافـاتـ عـلـىـ رـأـسـ القـضـيـبـ أوـ إـيـالـتـهـ مـنـ حـولـهـ لـمـعـ تـاكـلـ الـجـلـدـ أوـ النـزـفـ.
- توقفـ عنـ الـاسـتـخـدـامـ وـاسـتـشـيرـ اختـصـاصـيـاـ طـبـيـاـ إـذـاـ تـعـرـضـ لـأـيـ مـاـ يـلـيـ:

  - ظهورـ أـلـمـ جـدـيدـ أوـ تـقاـفـهـ فـيـ كـيسـ الصـفـنـ أوـ القـضـيـبـ أوـ الـبـطـنـ.
  - ظهورـ انـحنـاءـ أوـ انـبـاعـ جـدـيدـ.
  - ظهورـ تـغـيـرـ ثـابـتـ فـيـ لـوـنـ الـجـلـدـ، أوـ تـهـيـجـ، أوـ نـزـفـ، أوـ كـدـمـاتـ أوـ تـقـرـحـاتـ.
  - انـخـفـاضـ مـسـتـوىـ الـإـحـسـاسـ بـالـجـلـدـ.
  - أـلـمـ مـصـاحـبـ لـعـمـلـيـةـ السـحبـ.
  - تـدـهـرـ الـوظـيـفـةـ الـجـنـسـيـةـ.

## مواقع الاستعمال:

لا تستخدم **RestoreX** في الحالات التالية:  
• إذا كنت قد خضعت لعملية جراحية في القضيب أو الصفن أو الحوض خلال الأسابيع الستة الماضية ما لم يُشر طبيبك إلى خلاف ذلك.

- إذا كنت تعاني من آلام مزمنة في القضيب لا علاقه لها بمرض بيروني.
- إذا كنت تعاني من ألم مزمن في الخصية أو كيس الصفن.
- إذا كانت لديك تقرحات أو جروح مفتوحة على قضيبك.

لا يُنصح باستخدام **RestoreX** لدى الرجال الذين يعانون من أمراض الأوعية الدموية الشديدة بما في ذلك أولئك الذين يعانون من:  
• غياب الإحساس في أصابع اليدين أو القدمين أو الأطراف بسبب نقص التروية أو الاعتلال العصبي المرتبط بمرض السكري أو حالات مماثلة، خاصةً إذا أدت الحالة إلى فقدان الأصابع أو الأطراف.  
• التهابات جلد القضيب، والإصابات أو القروح المفتوحة.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها:

(1) يصعب استخدام الجهاز بسبب عدم القدرة على رؤية القضيب.  
• قم بإزالة المشبك من مبيت المشبك (الخطوة 3، الصفحة 8).

• بمجرد إزالة المشبك، ضع القضيب عبر حلقة الحوض. مع إخراج المشبك من المبيت، قم بتثبيت رأس القضيب في المشبك.  
• أعد تركيب المشبك في مبيته وطّأق الخطوة 1 الواردة في الصفحة 12.

(2) حجم القضيب لا يتناسب مع الجهاز  
• يستوعب **RestoreX** أطوال القضيب الممتدة التي تبلغ 10 سم (3.75 بوصات). إذا شعرت أن طول قضيبك الممتدد أقل من 10 سم (3.75 بوصات)، يجب محاولة إعادة القياس باستخدام الإرشادات الواردة في الخطوة 2 (الصفحات 6-7)  
ضمن "دليل الإعداد السريع". في أغلب الأحيان، يخطئ الأشخاص في قياس طول قضيبهم بطول أقصر من الحقيقي عن طريق عدم دفع المسطورة بعمق كافي داخل وسادة الدهون الموجودة في أسفل البطن. يجب قياس طول القضيب الممتدد الحقيقي من طرف القضيب إلى ارتفاق العانة (أو العظم الذي يتصل به القضيب).  
• بعد إعادة القياس، إذا كان طول قضيبك الممدود أقل من 10 سم (3.75 بوصات)، فاتصل بدعم علامة **PathRight Medical** للحصول على معلومات إضافية.

(3) القضيب طويلاً جداً ولا يمكن تمديده بالكامل.  
• اتصل بدعم علامة **PathRight Medical**.

(4) احتاج إلى القصبان الطويلة للتمديد المستقيم والقصبان القصيرة لإجراء الانحناء العكسي  
• اتصل بدعم علامة **PathRight Medical**.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها (تابع)

8) ماذا لو كان الانحناء لدى يعود إلى الخلف على القصيب أكثر من نقطة الانحناء؟

هذا مقبول. انظر الصور الواردة في الصفحات 18-20 للحصول على توصيات بشأن إجراء الانحناء العكسي. في تجربة سريرية لتقليم RestoreX، استجابت الانحناءات التي كانت أقرب إلى الجسم تماماً مثل تلك التي كانت فوق نقطة الانحناء مباشرةً. إجراء الانحناء مهم لأنّه يسمح بتطبيق قوة أكبر في اتجاه الانحناء مقارنة بالمناطق الأخرى من القصيب. إذا كانت المسافة من طرف القصيب إلى أنحناء قصيبك أكبر من 10.16 سم (4 بوصات)، فاستخدم فقط نقطة التوقف الأولى أو الثانية (30 درجة أو 60 درجة). سيؤدي الحد من زاوية القوة العكسية إلى زيادة الشد المطبق على موقع المرض.

### الرعاية:

- لا تستخدم مواد التزييق في RestoreX لأنها قد تؤدي إلى تلف الجهاز بصورة دائمة.

- التنظيف - لتنظيف الجهاز، امسح أي تربة أو ملوثات مرئية من الأسطح باستخدام منشفة ناعمة أو منديل الوجه. بعد ذلك، قم بتنظيف جميع أسطح RestoreX باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء والصابون. لا تغسل RestoreX أو تخمره في الماء، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف المكونات الداخلية. اترك جهاز RestoreX حتى يجف جيداً في مكان جيد التهوية قبل تخزينه.

تخلص من الجهاز وفقاً للوائح المحلية لديك.

المصدر	الوصف	عنوان الرمز	الرمز
ISO 15223-1 Ref. 5.1.1	يشير إلى الشركة المصنعة للجهاز الطبي.	الشركة المصنعة	
ISO 15223-1 Ref. 5.1.3	يشير إلى تاريخ تصنيع الجهاز الطبي.	تاريخ التصنيع	
ISO 15223-1 Ref. 5.1.6	يشير إلى كatalog الشركة المصنعة أو رقم الطراز.	رقم الكatalog	
ISO 15223-1 Ref. 5.1.5	يشير إلى رمز الدفعـة الخاص بالشركة المصنـعة.	رمز الدفعـة	
ISO 15223-1 Ref. 5.4.3	يشير إلى ضرورة مراجـعة المستـخدم لـتعليمـات الاستـخدام	راجع تعليمـات الاستـخدام أو راجـع التعليمـات الإلكتروـنية لـاستـخدام	
ISO 15223-1 Ref. 5.4.3	يشير إلى شركة النقل التي تحتوي على معلومات معرفـةـنـجـاـزـفـرـيـدـ	معرفـجـاـزـفـرـيـدـ	
ISO 15223-1 Ref. 5.7.4	يشير إلى موقع ويب يمكن للمريض من خلال الحصول على معلومات إضافـيةـنـجـاـزـفـرـيـدـ	موقع ويب معلوماتـالـمـرـيـضـ	
ISO 15223-1 Ref. 5.1.2	يشير إلى الممثل المعتمـدـفـيـالـمـجـمـوعـةـالأـورـوبـيـةـالـأـتـحـادـ	الممثلـالـمـعـتـمـدـفـيـالـمـجـمـوعـةـالأـورـوبـيـةـالـأـتـحـادـ	

لمزيد من المعلومات، التي تشمل مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، والمزيد من استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وغيرها، تفضل بزيارتنا على موقع الويب [www.restorex.com](http://www.restorex.com)



طريقك لاستعادة الصحة

الاتصال بنا

1-877-228-5147

9 صباحاً إلى 5 مساءً (المنطقة الزمنية الوسطى)،

من الاثنين إلى الجمعة

[support@pathrightmedical.com](mailto:support@pathrightmedical.com)

[RestoreX.com](http://RestoreX.com)

729-18-420051-06 Rev C



PathRight Medical, Inc. علامة تجارية مسجلة لشركة RestoreX

براءة الاختراع الأمريكية رقم 10,117,771 ، 6 نوفمبر 2018.

الطراز رقم 117